

**INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA  
PER I NATI DAL 2007 AL 2011  
AD ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE**

**CONTRO IL PAPILOMAVIRUS (HPV)  
CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPPO B)  
CONTRO LO PNEUMOCOCCO (PCV)  
CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)**

**DAL 8 OTTOBRE FINO AL 9 DICEMBRE**

**HUB Vaccinale CINECITTÀ**  
via Lamaro 12 (VII Municipio)

**SABATO 8.30 - 13.00**

**DAL 3 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE**

**Centro Vaccinale Affile**  
via Cerchiara 98 (IV Municipio)

**LUNEDÌ e GIOVEDÌ 14.00 - 16.30**

**Centro Vaccinale via degli Eucalipti 14**  
(V Municipio)

**GIOVEDÌ 14.00 - 16.30**

**Centro Vaccinale via Telese 80**  
(V Municipio)

**MARTEDÌ 14.00 - 16.00**

**Centro Vaccinale via Monza 2**  
(VII Municipio)

**MARTEDÌ 14.00 - 16.30**

**Centro Vaccinale via San Nemesio 21**  
presso CTO (VIII Municipio)

**MARTEDÌ e GIOVEDÌ 14.00 - 16.30**

**Centro Vaccinale via Silone 100**  
(IX Municipio)

**LUNEDÌ 14.00 - 16.30**

**Centro Vaccinale via Ardeatina 1227**  
(Centro della Gioia) (IX Municipio)

**LUNEDÌ 14.00 - 16.00**

**DAL 21 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE**

**Centro Vaccinale via Cambellotti 11**  
(VI Municipio)

**ENERDÌ 14.00 - 16.30  
SABATO 8.30 - 12.30**

**È NECESSARIO PRESENTARSI AL CENTRO VACCINALE MUNITI DI CERTIFICATO VACCINALE.  
È sempre possibile prenotare in altri orari, in altri giorni, in tutti i Centri Vaccinali.**

**SISTEMA SANITARIO REGIONALE**  
 **ASL  
ROMA 2**

 **REGIONE  
LAZIO**



## INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA PER I NATI DAL 2007 AL 2011

### CONTRO IL PAPPILLOMAVIRUS (HPV) CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPO B) CONTRO LO PNEUMOCOCCO (PCV) CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)

AD ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE  
presso qualsiasi Centro Vaccinale, nei giorni e negli orari indicati:

DAL 8 OTTOBRE FINO AL 9 DICEMBRE

- ✚ **HUB Vaccinale CINECITTÀ via Lamaro 12** (VII Municipio)  
nel giorno di SABATO dalle ore 8.30 alle ore 13.00

DAL 3 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE

- ✚ **Centro Vaccinale Affile via Cerchiara 98** (IV Municipio)  
nei giorni di LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via degli Eucalipti 14** (V Municipio)  
nel giorno di GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Telese 80** (V Municipio)  
nel giorno di MARTEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- ✚ **Centro Vaccinale via Monza 2** (VII Municipio)  
nel giorno di MARTEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via San Nemesio 21 presso CTO** (VIII Municipio)  
nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Silone 100** (IX Municipio)  
nel giorno di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Ardeatina 1227 (Centro della Gioia)** (IX Municipio)  
nel giorno di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.00

DAL 21 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE

- ✚ **Centro Vaccinale via Cambellotti 11** (VI Municipio)  
nel giorno di VENERDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30  
nel giorno di SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30

È necessario presentarsi al Centro Vaccinale muniti di certificato vaccinale.

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PRENOTARE IN ALTRI GIORNI, IN ALTRI ORARI,  
INTUTTI I CENTRI VACCINALI:

- accedendo on-line al sito <http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini>
- inoltrando una richiesta via e-mail a [vaccinazionihpv@aslroma2.it](mailto:vaccinazionihpv@aslroma2.it) indicando dati anagrafici, sede e giorno di preferenza per la vaccinazione

**VI ASPETTIAMO!**

## PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

**Il virus del HPV** è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali.

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

- **quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

**Il batterio del Meningococco** rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).

Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età.

L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

- **quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I vaccini possono essere co-somministrati.

**Il vaccino anti-Pneumococco** previene le più comuni polmoniti batteriche ma anche, meningiti e sepsi (infezione del sangue). Le patologie pneumococciche si verificano durante tutto l'anno e sono più frequenti nei bambini non protetti e negli anziani. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

**Il vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio** è la quinta dose di richiamo obbligatoria di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia (tre esavalenti e richiamo dei 6 anni).

Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.

È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita: si tratta di una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sempre gratuita. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.